

инструментальное обследование подтвердило наличие у пациентов краниомандибулярных дисфункций.

Вывод: Таким образом, проведенное исследование подтвердило высокую эффективность использования анкеты скрининг-опроса для выявления наличия краниомандибулярных дисфункций у пациентов при первичном обращении в клинику ортопедической стоматологии.

Литература:

1. Алиева Н. М., Очилова М. У., Толипова М. А. ШИНИРУЮЩИЕ СИСТЕМЫ В ЛЕЧЕНИИ ПАРОДОНТИТА СРЕДНЕЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ //RESEARCH AND EDUCATION. – 2022. – Т. 1. – №. 9. – С. 74-78.
2. Алиева Н. М., Толипова М. А., Очилова М. У. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ ИМПЛАНТАТОВ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДАХ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ НА ДЕНТАЛЬНЫХ ИМПЛАНТАТАХ //RESEARCH AND EDUCATION. – 2022. – Т. 1. – №. 9. – С. 222-230.
3. САЛИМОВ О. и др. РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЙ И МЕТОДОВ ИМПЛАНТАЦИИ ЗУБОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 3D-ПЕЧАТИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ИМПЛАНТОВ //World scientific research journal. – 2023. – Т. 22. – №. 1. – С. 152-162.
4. Салимов О. и др. ПРИМЕНЕНИЕ СИМУЛЯЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ МАНУАЛЬНЫМ НАВЫКАМ НА КАФЕДРЕ ПРОПЕДЕВТИКИ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ //Journal of new century innovations. – 2023. – Т. 43. – №. 3. – С. 13-23.

ПРИМЕНЕНИЕ СОЧЕТАННОЙ АНЕСТЕЗИИ (М/А И МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ СЕДАЦИЯ) В АМБУЛАТОРНОЙ СТОМАТОЛОГИИ У ДЕТЕЙ

Преподаватели: Салимов О.Р., Очилова М.У.

студент: Саминова М.

e-mail: ochilova.m@gmail.com

Кафедра пропедевтики ортопедической стоматологии

Актуальность: До сентября 2024 г. метод сочетанной анестезии в нашей клинике применялся выборочно и у небольшой группы детей старше 3-летнего возраста, так как по данным современной литературы методика считается малоэффективной у детей младшей возрастной группы.

Цель: повысить качество лечения детей в амбулаторной стоматологии на основании сочетанного применения препаратов для премедикации и местных анестетиков и разработать алгоритм выбора анестезиологического пособия при стоматологических манипуляциях.

Материал и методы: За период 2024 г. 180 детей в возрасте от 1 года до 7 лет с различной степенью кариеса зубов и его осложнениями, которым проводилось лечение в условиях сочетанной анестезии. Анализировались глубина седации путем применения визуальных шкал и BIS-мониторинга, общее состояние детей.

Качество лечения в условиях сочетанной анестезии оценивалось при помощи опросников врачей-стоматологов и родителей пролеченных детей.

Результаты: Общее количество посещений (для лечения) в отделении детской терапии — 816, из них дети до 5 лет (потенциальная целевая группа) — 382 (46,8%), до 3 лет — 294 (36%). Столь высокий процент связан со специализацией отделения на лечении в условиях общего обезболивания. В связи с этим на прием попадает большое количество пациентов, уже имеющих негативный опыт лечения и получивших направление на лечение под наркозом. За эти 4 мес под наркозом пролечены 65 детей (из них 85% — дети в возрасте до 5 лет), а в условиях сочетанной анестезии (премедикация и местная анестезия) — 102. Средний возраст детей при сочетанной анестезии — 39 мес (3 года 2 мес). Таким образом, под сочетанной анестезией получили лечение больше детей (18%), чем, собственно, в условиях общего обезболивания (17%). Более того, по нашим данным, 20,6% детей, пролеченных в условиях сочетанной анестезии, были младше 2 лет. Последние данные особенно важны, так как данной возрастной группе предлагают стоматологическое лечение в условиях эндотрахеального наркоза, без какой-либо альтернативы.

Вывод: Проанализировав полученные данные, мы пришли к выводу, что сочетанное применение препаратов медикаментозной седации и местных анестетиков в амбулаторной стоматологии эффективно у детей младшей возрастной группы. Своевременная правильная оценка психологического статуса с последующим проведением седации для терапевтической и хирургической санации полости рта у пациентов детского возраста позволяет в дальнейшем проводить стоматологическое лечение без анестезиологического пособия.

Литература

1. Касимова Э. В. и др. ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ДЕФИЦИТОМ ЭСТРОГЕНОВ И ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПАРОДОНТА У ЖЕНЩИН В ПЕРИОДЕ ПОСТМЕНОПАУЗЫ //Journal of new century innovations. – 2022. – Т. 18. – №. 3. – С. 49-71.
2. САЛИМОВ О. Р. и др. Ортопедические Методы Лечение Заболеваний Височно-Нижнечелюстного Сустава (Литературный Обзор) //Journal of new century innovations. – 2022. – Т. 18. – №. 3. – С. 3-29.
3. АЛИЕВА Н. М. и др. ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ПАРОДОНТИТА СРЕДНЕЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ШИНИРУЮЩИМИ СИСТЕМАМИ ТАШКЕНТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ //Journal of new century innovations. – 2022. – Т. 18. – №. 3. – С. 119-143.

ОЦЕНКА НАРУШЕНИЙ ОККЛЮЗИОННО-АРТИКУЛЯЦИОННЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ПРИ ЧАСТИЧНОЙ ПОТЕРЕ ЗУБОВ

Преподаватели: Салимов О.Р., Очилова М.У

студент: Давлатов С.

e-mail: ochilova.m@gmail.com

Кафедра пропедевтики ортопедической стоматологии